

# Практические рекомендации по оказанию стоматологической помощи пациентам, получающим эмицизумаб



1

**Тактика терапии определяется риском послеоперационного вмешательства** (см. таблицу ниже)

2

**При проведении стоматологических манипуляций с низким риском кровотечения возможно применение только транексамовой кислоты**

Перорально или местно без дополнительного назначения гемостатических препаратов и наблюдение за состоянием пациента.<sup>3</sup>

3

**У пациентов с ингибиторной формой гемофилии А при кровотечении, которое требует терапии, предпочтение рекомендуется отдавать rFVIIa в начальной дозе 90 мкг/кг**

Продолжительность применения rFVIIa при возникновении кровотечения определяет клиническая картина.<sup>3</sup>

4

**Пациентам с гемофилией А без ингибиторов при развитии кровотечения применяется препарат FVIII в стандартной дозе<sup>1,2</sup>**

## Классификация инвазивных процедур и оперативных вмешательств в зависимости от ассоциированного с ними риска кровотечений

### Оперативные вмешательства с низким риском кровотечения

- Малые стоматологические вмешательства (профессиональная гигиеническая чистка, удаление зубного камня и т.д.)
- Удаление 1 зуба/удаление зуба с 1 корнем

### Оперативные вмешательства с высоким риском кровотечения

- Удаление 2 и более зубов одновременно
- Удаление зуба с 2 и более корнями
- Хирургическое лечение пародонтита
- Вскрытие абсцессов десны
- Имплантация

1. Santagostino, Elena, Johannes Oldenburg, and Tiffany Chang. "Surgical experience from four phase III studies (HAVEN 1-4) of emicizumab in persons with haemophilia A (PwHA) with or without FVIII inhibitors." Res Pract Thromb Haemost 3.S1 (2019): 115. 2. Santagostino E, Oldenburg J, Chang T, et al. Surgical experience from four phase III studies (HAVEN 1-4) of emicizumab in persons with haemophilia A (PwHA) with or without FVIII inhibitors. Presented at the Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis in Melbourne, Australia; July 6-10, 2019. ISTH Oral Presentation. 3. Susen, S., Gruel, Y., Godier, A., Harroche, A., Chambost, H., Lasne, D., & Négrier, C. (2019). Management of bleeding and invasive procedures in haemophilia A patients with inhibitor treated with emicizumab (Hemlibra®): proposals from the French network on inherited bleeding disorders (MHEMO), the French Reference Centre on Haemophilia, in collaboration with the French Working Group on Perioperative Haemostasis (GIHP). Haemophilia, 25(5), 731-737.



Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению эмицизумаба, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке <https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/Hemlibra.html>

Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229-29-99, и мы пришлем инструкцию по указанному Вами адресу.

©АО «Рош-Москва», 2023 г.

Вы получили данное письмо от компании АО «Рош-Москва», потому что дали согласие на рассылку информационных сообщений. С Политикой по обработке персональных данных компании «Рош» можно ознакомиться по [ссылке](#). Сведения, содержащиеся в данном письме, носят информационный характер и направлены Вам исключительно с целью предоставления наиболее актуальной научно-справочной информации. Информация в данном письме не может рассматриваться в качестве публичной оферты, не имеет целью воздействовать на продвижение продукции/услуг компании «Рош» и сама по себе не должна служить основанием для принятия каких-либо решений о назначении (выписке) какого-либо препарата. Если у Вас есть вопрос, Вы можете задать его в [службу медицинской информации](#).

АО «Рош-Москва»  
107031, Россия, г. Москва, Трубная площадь, дом 2,  
помещение I, этаж 1, комната 42, МФК «Галерея Неглинная»  
Тел. +7 (495) 229-29-99  
[www.roche.ru](http://www.roche.ru)

M-RU-00012196 июнь 2023  
Информация предназначена для медицинских работников