

# АТЕЗОЛИЗУМАБ – ПЕРВЫЙ PD-L1 ИНГИБИТОР, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В РОССИИ

## ПОКАЗАНИЯ:



### Немелкоклеточный рак легкого

- Адьювантная терапия немелкоклеточного рака легкого у пациентов II–IIIА стадий\* с наличием экспрессии PD-L1  $\geq 50\%$  на клетках опухоли после полной хирургической резекции и последующей ХТ на основе препаратов платины
- 1-я линия терапии метастатического неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого в комбинации с бевацизумабом, паклитакселом и карбоплатином. У пациентов с *EGFR* или *ALK* мутацией комбинация показана только после неэффективности соответствующей таргетной терапии
- 1-я линия терапии метастатического немелкоклеточного рака легкого с наличием экспрессии PD-L1  $\geq 50\%$  на клетках опухоли или при наличии экспрессии PD-L1  $\geq 10\%$  на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих ткань опухоли, при отсутствии *EGFR* или *ALK* геномной опухолевой мутации
- 1-я линия терапии метастатического неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого в комбинации с наб-паклитакселом и карбоплатином при отсутствии *EGFR* или *ALK* геномной опухолевой мутации
- 2-я линия терапии местнораспространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого после предшествующей химиотерапии. Пациенты с *EGFR* или *ALK* мутацией должны получить предшествующую таргетную терапию



### Мелкоклеточный рак легкого

- 1-я линия терапии распространенного мелкоклеточного рака легкого в комбинации с карбоплатином и этопозидом



### Гепатоцеллюлярная карцинома

- 1-я линия терапии неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномы в комбинации с бевацизумабом у пациентов без предшествующей системной терапии независимо от уровня экспрессии PD-L1



### Рак молочной железы

- 1-я линия терапии неоперабельного местнораспространенного или метастатического тройного негативного рака молочной железы в комбинации с наб-паклитакселом при наличии экспрессии PD-L1  $\geq 1\%$  на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих ткань опухоли



### Уротелиальный рак

- 1-я линия терапии местнораспространенного или метастатического уротелиального рака при невозможности лечения цисплатином с наличием экспрессии PD-L1  $\geq 5\%$  на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих ткань опухоли
- 1-я линия терапии местнораспространенного или метастатического уротелиального рака при невозможности проведения любой платиносодержащей химиотерапии независимо от уровня экспрессии PD-L1
- 2-я линия терапии местнораспространенного или метастатического уротелиального рака у пациентов, которые ранее получали платиносодержащую химиотерапию



### Меланома

- 1-я линия терапии неоперабельной или метастатической меланомы с *BRAF V600* мутацией в комбинации с препаратами кобиметиниб и вемурафениб независимо от уровня экспрессии PD-L1

## СХЕМЫ С ПРЕПАРАТОМ АТЕЗОЛИЗУМАБ ВКЛЮЧЕНЫ В ГРУППИРОВЩИКИ КСГ ДЛЯ ДНЕВНОГО И КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА В 2023 г.

Показания препарата атезолизумаб	Описание схемы	Дневной стационар		Круглосуточный стационар	
		Код схемы	КСГ	Код схемы	КСГ
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Адьювантная терапия: НМРЛ II-IIIА стадии*</li> <li>✓ 1-я линия терапии: метастатического НМРЛ; местнораспространенного или метастатического УР</li> <li>✓ 2-я линия терапии: местнораспространенного или метастатического НМРЛ; местнораспространенного или метастатического УР</li> <li>✓ Поддерживающая терапия распространенного МРЛ</li> </ul>	Атезолизумаб 1200 мг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.109 (уровень 13)	sh0450	st19.137 (уровень 13)	sh0450
	Атезолизумаб 840 мг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.107 (уровень 11)	sh0714	st19.136 (уровень 12)	sh0714
	Атезолизумаб 1680 мг в 1-й день; цикл 28 дней	ds19.110 (уровень 14)	sh0715	st19.139 (уровень 15)	sh0715
✓ 1-я линия терапии неплоскоклеточного мНМРЛ	Атезолизумаб 1200 мг в 1-й день + паклитаксел 175-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин АUC 6 в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.111 (уровень 15)	sh0796	st19.139 (уровень 15)	sh0796
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1-я линия терапии неоперабельной ГЦК</li> <li>✓ Поддерживающая терапия неплоскоклеточного мНМРЛ в 1-й линии терапии</li> </ul>	Атезолизумаб 1200 мг в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.111 (уровень 15)	sh0961	st19.139 (уровень 15)	sh0961
✓ 1-я линия терапии распространенного МРЛ	Этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + карбоплатин АUC 5 в 1-й день + атезолизумаб 1200 мг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.109 (уровень 13)	sh0976	st19.138 (уровень 14)	sh0976

**Атезолизумаб позволяет снизить расходы на терапию приблизительно на 30% и пролечить большее количество пациентов с НМРЛ, что может способствовать достижению целевых показателей по снижению одногодичной летальности и увеличению доли пролеченных пациентов**

\* Система стадирования UICC/AJCC, 7-я редакция.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата атезолизумаб; Зырянов С.К., Фармакоэкономика. Современная Фармакоэкономика и Фармакоэпидемиология. 2020, Том 13, №1, стр. 5-12.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
M-RU-00010272 Февраль 2023 г.

АО «Рош-Москва»  
107031, Россия, г. Москва  
Трубная площадь, дом 2  
Помещение I, этаж 1, комната 42  
МФК «Галерея Неглинная»  
Тел.: +7 (495) 229-29-99  
www.roche.ru



Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата атезолизумаб, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке: <https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html>  
Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229-29-99, и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

