

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЕКТИНИБА И КРИЗОТИНИБА В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (RWD АНАЛИЗ)



N = 141
 Пациенты, получавшие алектиниб


N = 223
 Пациенты, получавшие кризотиниб

Конечные точки: ✓ ВБП ✓ ОВ ✓ Время до появления новых метастазов в ЦНС


Характеристики пациентов

| | Алектиниб (n = 141) | Кризотиниб (n = 223) |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Возраст, среднее (диапазон), годы | 63,1 (12,8) | 62,2 (12,3) |
| Женский пол, % | 53,2 | 54,3 |
| ECOG, % | | |
| 0 / 1 | 53,9 | 35,9 |
| 2 | 9,2 | 8,1 |
| 3 | 2,1 | 3,1 |
| 4 | 0 | 0,4 |
| Неизвестно | 34,8 | 52,5 |
| Гистологический тип, % | | |
| Неплоскоклеточный | 96,5 | 95,1 |
| Плоскоклеточный | 2,8 | 1,8 |
| Без дополнительного уточнения | 0,7 | 3,1 |
| Метастазы в ЦНС до начала терапии, % | 37,6 | 26,0 |
| Курение в анамнезе, % | 38,3 | 49,8 |

Алектиниб подтвердил значительное преимущество над кризотинибом по эффективности



Алектиниб значительно увеличивал время до рецидива в ЦНС по сравнению с кризотинибом



Вывод: в популяции RWD, которая была отобрана по критериям включения и исключения исследования ALEX (RWD, схожие с ALEX), преимущество алектиниба над кризотинибом по выживаемости соответствовало результатам исследования ALEX.

Алектиниб – предпочтительный препарат 1-й линии терапии ALK+ НМРЛ

Алектиниб в клиническом исследовании III фазы ALEX:

- ✓ Увеличивает медиану ВБП до **34,8** месяца по сравнению с **10,9** месяца на терапии кризотинибом
- ✓ Риск прогрессирования в ЦНС снижен в **6** раз по сравнению с кризотинибом
- ✓ Более **60%** пациентов продолжают жить в течение **5** лет после начала терапии

Преимущество в эффективности алектиниба над кризотинибом подтверждено в условиях реальной клинической практики

ОР – отношение рисков; ДИ – доверительный интервал; МТС – метастазы. Средняя продолжительность оценки ВБП и ОБ составила 15,2 мес. и 19,1 мес. в группе алектиниба и 19,5 мес. и 44,2 мес. в группе кризотиниба, соответственно.

1. Ретроспективный анализ электронных медицинских карт пациентов из США с целью сравнения эффективности алектиниба и кризотиниба в 1-й линии терапии у пациентов с распространенным ALK+ НМРЛ. Matthew G. Krebs, et al. ESMO 2021. 2. Camidge DR, et al. ASCO 2018; 3. Peters S, et al. N Engl J Med. 2017; 4. Mok T, et al. Ann Oncol 2020. 5. Клинические рекомендации МЗ РФ 2021.

Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата алектиниб, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке: <https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/alecensa.html>. Если Вам требуются распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 229-29-99, и мы пришлём инструкцию по указанному Вами адресу.

