

Возможности переключений с других препаратов

Переключение на ПИТРС с высокой эффективностью после предшествующей терапии РРС

Предыдущая терапия	Период «отмывки»	Дополнительный контроль лабораторных показателей
глатирамера ацетат	Не требуется	
препараты интерферонов-бета	Не требуется	
диметилфумарат	0–4 недель	> 800–1000 кл/мкл
терифлуномид	0–4 недель	>1000 кл/мкл
модификаторы сфингозиновых рецепторов	4–8 недель	>1000 кл/мкл
натализумаб	4 недели – 6 месяцев	Контроль риска ПМЛ
алемтузумаб	4–6 месяцев	при нормальном уровне лимфоцитов
кладрибин	12 недель	при нормальном уровне лимфоцитов
окрелизумаб	3–6 месяцев	при нормальном уровне лимфоцитов

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Окревус® от 15.04.2025, регистрационное удостоверение No ЛП-No(003473)-(РГ-RU) от 15.04.2025.

1. Brieва L, Estruch BC, Merino JAG, Meca-Lallana V, Río J, Rodríguez-Antigüedad A, Agüera E, Ara JR, Luque AA, Garcia CA, Blanco Y, Castillo-Triviño T, Costa-Frossard L, González Platas M, Pascual LL, Llaneza-González M, Ginés MLM, Matías-Guiu J, Meca-Lallana JE, Bilbao MM, Sempere AP, Romero-Pinel L, Saiz A, Moral E. Disease modifying therapy switching in relapsing multiple sclerosis: A Delphi consensus of the demyelinating expert group of the Spanish society of neurology. Mult Scler Relat Disord. 2022 Jul; 63:103805

2. Kevin Bigaut and al./ How to switch disease-modifying treatments in multiple sclerosis: Guidelines from the French Multiple Sclerosis Society (SFSEP) // Multiple Sclerosis and Related Disorders 53 (2021) 103076

3. Бойко АН, Давыдовская МВ, Хачанова НВ и др. Клинические рекомендации по применению препарата окрелизумаб у пациентов с рассеянным склерозом. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;11(3):16–25.

M-RU-00021868, май 2025