

Памятка: стадирование и классификация TNM при колоректальном раке

T — первичная опухоль

Tis — карцинома in situ: опухоль ограничена слизистой оболочкой.

T1 — опухоль прорастает в подслизистый слой.

T2 — опухоль прорастает в мышечный слой.

T3 — опухоль распространяется за пределы мышечного слоя в субсерозную клетчатку или перитонизированную околокишечную клетчатку.

T4a — опухоль прорастает висцеральную брюшину.

T4b — опухоль непосредственно вовлекает или прорастает соседние органы или структуры.

N — регионарные лимфатические узлы

N0 — метастазов в регионарных лимфатических узлах нет.

N1a — метастаз в 1 регионарном лимфатическом узле.

N1b — метастазы в 2–3 регионарных лимфатических узлах.

N1c — опухолевые депозиты без метастазов в регионарных лимфатических узлах.

N2a — метастазы в 4–6 регионарных лимфатических узлах.

N2b — метастазы в 7 и более регионарных лимфатических узлах.

M — отдаленные метастазы

M0 — отдаленных метастазов нет.

M1 — отдаленные метастазы есть.

M1a — метастазы ограничены одним органом или одной анатомической областью.

M1b — метастазы более чем в одном органе или анатомической области.

M1c — метастазы по брюшине с метастазами в другие органы или без них.

Группировка стадий

Стадия	T	N	M
0	Tis	N0	M0
I	T1–T2	N0	M0
II	T3–T4	N0	M0
IIA	T3	N0	M0
IIB	T4a	N0	M0
IIC	T4b	N0	M0
III	Любая	N1–N2	M0
IIIA	T1–T2	N1	M0
	T1	N2a	M0
IIIB	T3–T4a	N1	M0
	T2–T3	N2a	M0
IIIC	T4b	N1–N2a–N2b	M0
	T4a	N2a	M0
	T3–T4a	N2b	M0
IV	Любая	Любая	M1
IVa	Любая	Любая	M1a
IVb	Любая	Любая	M1b
IVc	Любая	Любая	M1c

Клиническое и патологическое стадирование

сTNM — клиническое стадирование до начала лечения.

рTNM — патологическое стадирование после операции и морфологического исследования.

усTNM / ypTNM — стадирование после неoadъювантной терапии: клиническое или патологическое соответственно.