

Классификация TNM

Для определения стадии рака щитовидной железы используется классификация TNM

Стадирование

Для определения стадии рака щитовидной железы используется классификация TNM (8-е издание, 2017 г.).

T – первичная опухоль

- **Tx** – недостаточно данных для оценки первичной опухоли;
- **T0** – первичная опухоль не определяется;
- **T1** – опухоль размером до 2 см в наибольшем измерении, ограниченная тканью ЩЖ;
- **T1a** – опухоль размером <1 см, ограниченная тканью ЩЖ;
- **T1b** – опухоль размером более 1, но менее 2 см в диаметре, ограниченная тканью ЩЖ;
- **T2** – опухоль размером более 2, но не более 4 см в наибольшем измерении, ограниченная тканью ЩЖ;
- **T3** – опухоль размером >4 см в наибольшем измерении, ограниченная тканью ЩЖ, или любая опухоль с минимальным распространением за пределы капсулы (в m. sternothyroid или мягкие ткани около ЩЖ);
- **T3a** – опухоль размером >4 см, ограниченная тканью ЩЖ;
- **T3b** – любого размера опухоль с макроскопическим распространением за пределы капсулы ЩЖ с инвазией только в подподъязычные мышцы (грудиноподъязычную, грудинощитовидную, щитоподъязычную или лопаточно-подъязычную);
- **T4** – массивное распространение опухоли за пределы капсулы ЩЖ;
- **T4a** – опухоль прорастает в капсулу ЩЖ и распространяется на любую из следующих структур: подкожные мягкие ткани, гортань, трахею, пищевод, возвратный нерв;
- **T4b** – опухоль распространяется на предпозвоночную фасцию, сосуды средостения или оболочку сонной артерии.

N – вовлечение регионарных лимфатических узлов

- **Nx** – недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов;

- **N0** – нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов;
- **N0a** – один или несколько лимфатических узлов с цитологическим или гистологическим подтверждением отсутствия опухоли;
- **N0b** – отсутствие радиологических или клинических признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов;
- **N1** – имеется поражение регионарных лимфатических узлов метастазами;
- **N1a** – метастазы в лимфатических узлах VI или VII уровней (пре- и паратрахеальные, преларингеальные или верхние средостенные). Как одностороннее, так и двустороннее поражение;
- **N1b** – метастазы в шейных лимфатических узлах на одной стороне или с обеих сторон, или на противоположной стороне (I, II, III, IV или V), или в заглочных лимфатических узлах.

M – отдаленные метастазы

- **M0** – нет признаков отдаленных метастазов;
- **M1** – имеются отдаленные метастазы.

Группировка по стадиям

Дифференцированный рак, включая медуллярный рак (До 55 лет)			
Стадия I	Любая T	Любая N	M0
Стадия II	Любая T	Любая N	M1
Дифференцированный рак, включая медуллярный рак (От 55 лет и старше)			
Стадия I	T1	N0/Nx	M0
	T2	N0	M0
Стадия II	T1	N1	M0
	T2	N1	M0
	T3a/b	N любая	M0
Стадия III	T4a	N любая	M0
Стадия IVA	T4b	N любая	M0
Стадия IVB	T4b	N любая	M1
Анапластический рак			
Стадия IVa	T1–3a	N0/Nx	M0
Стадия IVB	T1–3a	N1	M0
	T3b	N любая	M0
	T4b	N любая	M0
Стадия IVc	T любая	N любая	M1

Клинические рекомендации

RUSSCO

Рубрикатор клинических рекомендаций МЗ

Главная Заболевания Препараты Мероприятия Инновации INNO-ПУЛЬС

О портале	Положение о конфиденциальности	Вход для сотрудников
Наши авторы	Правовое соглашение	
Сообщить о нежелательном явлении	Политика оператора в отношении обработки персональных данных	
Медицинская информация	Настройки файлов cookie	
Карта сайта		

Инструкции по медицинскому применению актуальны на момент создания материала. Актуальные инструкции размещаются на сайте roche.ru в Каталоге продукции. | АО «Рош-Москва», 107045, г. Москва, Трубная площадь, дом 2 эт/пом/ком 1, I, 42. | email: moscow.reception@roche.com | Все права защищены | Информация на данном веб-сайте предназначена для медицинских работников. | Сайт предназначен только для посетителей, находящихся в Российской Федерации.